

# Welche seltenen Vogelarten sollen an die AFK gemeldet werden?

## Which bird species should be reported to the AFK?

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich, letzte Änderung 17.3.2023  
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria, updated 17th March 2023



### Legende

- <sup>1</sup> nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.
- <sup>2</sup> ausgenommen Beobachtungen am Frühjahrszug im Neusiedler See-Gebiet.
- <sup>3</sup> nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.
- <sup>4</sup> nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.
- <sup>5</sup> nur Nachweise ab dem 1. Juli.
- <sup>6</sup> nur Feststellungen abseits der etablierten Brutgebiete (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete (bei Aufforderung nach Eingabe auf ornitho.at).
- <sup>7</sup> nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.
- <sup>8</sup> nur Feststellungen von Vögeln deren Herkunft gesichert ist (z.B. durch Beringung).
- <sup>9</sup> nur Feststellungen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

### Allgemeines

Die letzten Änderungen finden sich auf Seite 2. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf [www.birdlife-afk.at](http://www.birdlife-afk.at)) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Ringelgans ( <i>Branta bernicla</i> )	Schwalbenmöwe ( <i>Xema sabini</i> )	Seidensänger ( <i>Cettia cetti</i> )
Rothalsgans <sup>1,7</sup> ( <i>Branta ruficollis</i> )	Lachseeschwalbe ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )	Gelbbräuen-Laubsänger ( <i>Phylloscopus inornatus</i> )
Waldsaatgans ( <i>Anser fabalis</i> )	Rüppellseeschwalbe ( <i>Thalasseus bengalensis</i> )	Goldhähnchen-Laubsänger ( <i>Phylloscopus proregulus</i> )
Kurzschnebelgans ( <i>Anser brachyrhynchus</i> )	Rosenseeschwalbe ( <i>Sterna dougalli</i> )	Dunkellaubsänger ( <i>Phylloscopus nurcatus</i> )
Blässgans ( <i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i> )	Küstenseeschwalbe ( <i>Sterna paradisaea</i> )	Zilpzalp <sup>8</sup> ( <i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i> )
Zwerggans <sup>1</sup> ( <i>Anser erythropus</i> )	Skua ( <i>Stercorarius skua</i> )	Iberienzilpzalp ( <i>Phylloscopus iberiae</i> )
Zwergschwan <sup>3</sup> ( <i>Cygnus columbianus</i> )	Spatelraubmöwe ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )	Grünlaubsänger ( <i>Phylloscopus trochiloides</i> )
Blaufügelente ( <i>Spatula discors</i> )	Schmarotzerraubmöwe ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )	Mariskenrohrsänger <sup>6</sup> ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )
Sichelente ( <i>Mareca falcata</i> )	Falkenraubmöwe ( <i>Stercorarius longicaudus</i> )	Seggenrohrsänger ( <i>Acrocephalus paludicola</i> )
Nordamerikanische Pfeifente ( <i>Mareca americana</i> )	Krabbenentaucher ( <i>Alle alle</i> )	Feldrohrsänger ( <i>Acrocephalus agricola</i> )
Amerikanische Krickente ( <i>Anas carolinensis</i> )	Dickschnabellumme ( <i>Uria lomvia</i> )	Buschrohrsänger ( <i>Acrocephalus dumetorum</i> )
Ringschnabelente ( <i>Aythya collaris</i> )	Trottellumme ( <i>Uria aalge</i> )	Buschspötter ( <i>Iduna caligata</i> )
Kragenente ( <i>Histrionicus histrionicus</i> )	Tordalk ( <i>Alca torda</i> )	Blassspötter ( <i>Iduna pallida</i> )
Schwarzkopf-Ruderente ( <i>Oxyura jamaicensis</i> )	Papageitaucher ( <i>Fratercula arctica</i> )	Orpheusspötter ( <i>Hippolais polyglotta</i> )
Weißkopf-Ruderente ( <i>Oxyura leucocephala</i> )	Eistaucher ( <i>Gavia immer</i> )	Zistensänger ( <i>Cisticola juncidis</i> )
Steinhuhn <sup>8</sup> ( <i>Alectoris graeca</i> )	Gelbschnabeltaucher ( <i>Gavia adamsii</i> )	Orpheusgrasmücke ( <i>Curruca hortensis</i> )
Großtrappe <sup>6</sup> ( <i>Otis tarda</i> )	Sturmwellenläufer ( <i>Hydrobates pelagicus</i> )	Wüstengrasmücke ( <i>Curruca nana</i> )
Steppenkranttrappe ( <i>Chlamydotis macqueenii</i> )	Wellenläufer ( <i>Hydrobates leucorhous</i> )	Samtkopf-Grasmücke ( <i>Curruca melanocephala</i> )
Zwergtrappe ( <i>Tetrax tetrax</i> )	Sepiasturmtaucher ( <i>Calonectris diomedea</i> )	Balkan-Bartgrasmücke ( <i>Curruca cantillans</i> )
Häherkuckuck ( <i>Clamator glandarius</i> )	Mittelmeer-Sturmtaucher ( <i>Puffinus yelkouan</i> )	Rosenstar <sup>5</sup> ( <i>Pastor roseus</i> )
Steppenflughuhn ( <i>Syrhaptes paradoxus</i> )	Basstöpel ( <i>Morus bassanus</i> )	Erddrossel ( <i>Zoothera aurea</i> )
Orientalurtaube ( <i>Streptopelia orientalis</i> )	Krähenscharbe ( <i>Gulosus aristotelis</i> )	Schwarzkehlrossel ( <i>Turdus atrogularis</i> )
Purpurhuhn ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	Heiliger Ibis <sup>8</sup> ( <i>Threskiornis aethiopicus</i> )	Rostflügelrossel ( <i>Turdus eunomus</i> )
Zwergsumpfhuhn ( <i>Zapornia pusilla</i> )	Sichler ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	Rostschwanzdrossel ( <i>Turdus naumanni</i> )
Jungfernkranich ( <i>Grus virgo</i> )	Rosapelikan ( <i>Pelecanus onocrotalus</i> )	Wanderdrossel ( <i>Turdus migratorius</i> )
Rosaflamingo ( <i>Phoenicopeterus roseus</i> )	Krauskopfpelikan ( <i>Pelecanus crispus</i> )	Sprosser ( <i>Luscinia luscinia</i> )
Steppenkiebitz ( <i>Vanellus gregarius</i> )	Gleitaar ( <i>Elanus caeruleus</i> )	Halbringschnäpper ( <i>Ficedula semitorquata</i> )
Weißschwanzkiebitz ( <i>Vanellus leucurus</i> )	Schmutzgeier ( <i>Neophron percnopterus</i> )	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i> )
Pazifischer Goldregenpfeifer ( <i>Pluvialis fulva</i> )	Mönchsgeier ( <i>Aegypius monachus</i> )	Steinrötel <sup>6</sup> ( <i>Monticola saxatilis</i> )
Amerikanischer Goldregenpfeifer ( <i>Pluvialis dominica</i> )	Schlangenadler ( <i>Circus cyaneus</i> )	Blaumerle ( <i>Monticola solitarius</i> )
Seeregenpfeifer <sup>1,3</sup> ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	Schreiadler ( <i>Clanga pomarina</i> )	Sibirisches Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola maurus</i> )
Wüstenregenpfeifer ( <i>Charadrius leschenaultii</i> )	Schelladler ( <i>Clanga clanga</i> )	Isabellsteinschmätzer ( <i>Oenanthe isabellina</i> )
Dünnschnabel-Brachvogel ( <i>Numenius tenuirostris</i> )	Zwergadler ( <i>Aquila pennata</i> )	Wüstensteinschmätzer ( <i>Oenanthe deserti</i> )
Sumpfläufer <sup>1</sup> ( <i>Calidris falcinellus</i> )	Steppenadler ( <i>Aquila nipalensis</i> )	Nonnensteinschmätzer ( <i>Oenanthe pleschanka</i> )
Weißbühlchen-Strandläufer ( <i>Calidris fuscicollis</i> )	Kaiseradler <sup>9</sup> ( <i>Aquila heliaca</i> )	Balkansteinschmätzer ( <i>Oenanthe melanoleuca</i> )
Grasläufer ( <i>Calidris subruficollis</i> )	Habichtsadler ( <i>Aquila fasciata</i> )	Steinsperling ( <i>Petronia petronia</i> )
Bairdstrandläufer ( <i>Calidris bairdii</i> )	Kurzfangsperber ( <i>Accipiter brevipes</i> )	Schneesperling <sup>8</sup> ( <i>Montifringilla nivalis</i> )
Graubrust-Strandläufer ( <i>Calidris melanotos</i> )	Sperbereule ( <i>Sumia ulula</i> )	Bergbraunelle ( <i>Prunella montanella</i> )
Sandstrandläufer ( <i>Calidris pusilla</i> )	Schneeeule ( <i>Bubo scandiacus</i> )	Schafstelze ( <i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i> )
Meerstrandläufer ( <i>Calidris maritima</i> )	Blauracke <sup>6</sup> ( <i>Coracias garrulus</i> )	Zitronenstelze <sup>5</sup> ( <i>Motacilla citreola</i> )
Spitzschwanz-Strandläufer ( <i>Calidris acuminata</i> )	Blauwangenspint ( <i>Merops persicus</i> )	Bachstelze <sup>4</sup> ( <i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i> )
Doppelschnepfe <sup>2</sup> ( <i>Gallinago media</i> )	Rötelfalke ( <i>Falco naumanni</i> )	Spornpieper ( <i>Anthus richardi</i> )
Terekwasserläufer ( <i>Xenus cinereus</i> )	Eleonorenfalke ( <i>Falco eleonora</i> )	Waldpieper ( <i>Anthus hodgsoni</i> )
Thorshühnchen ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )	Sakerfalke <sup>6</sup> ( <i>Falco cherrug</i> )	Strandpieper ( <i>Anthus petrosus</i> )
Drosseluferläufer ( <i>Actitis macularia</i> )	Gerfalke ( <i>Falco rusticolus</i> )	Hakengimpel ( <i>Pinicola enucleator</i> )
Kleiner Gelbschenkel ( <i>Tringa flavipes</i> )	Isabellwürger ( <i>Lanius isabellinus</i> )	Wüstengimpel ( <i>Bucanetes githagineus</i> )
Rennvogel ( <i>Cursorius cursor</i> )	Schwarzstirnwürger <sup>6</sup> ( <i>Lanius minor</i> )	Berghänfling <sup>1</sup> ( <i>Carduelis flavirostris</i> )
Rotflügel-Brachschwalbe ( <i>Glareola pratincola</i> )	Raubwürger ( <i>Lanius excubitor</i> , alle Unterarten außer <i>excubitor</i> )	Polarbirkenzeisig ( <i>Carduelis homemanni</i> )
Schwarzflügel-Brachschwalbe ( <i>Glareola nordmanni</i> )	Rotkopfwürger ( <i>Lanius senator</i> )	Kiefernkreuzschnabel ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> )
Dünnschnabelmöwe ( <i>Chroicocephalus genei</i> )	Alpenkrähe ( <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> )	Bindenkreuzschnabel ( <i>Loxia leucoptera</i> )
Präriemöwe ( <i>Leucophaeus pipixcan</i> )	Alpendohle <sup>6</sup> ( <i>Pyrrhocorax graculus</i> )	Zitronenzeisig <sup>6</sup> ( <i>Serinus citrinella</i> )
Fischmöwe ( <i>Ichthyophaga ichthyophaga</i> )	Lasurmeise ( <i>Cyanistes cyanus</i> )	Spornammer ( <i>Calcarius lapponicus</i> )
Korallenmöwe ( <i>Ichthyophaga audouinii</i> )	Weißflügellerche ( <i>Alauda leucoptera</i> )	Fichtenammer ( <i>Emberiza leucocephala</i> )
Ringschnabelmöwe ( <i>Larus delawarensis</i> )	Ohrenlerche ( <i>Eremophila alpestris</i> )	Zaunammer <sup>6</sup> ( <i>Emberiza cirius</i> )
Mantelmöwe ( <i>Larus marinus</i> )	Kurzzeilenlerche ( <i>Calandrella brachydactyla</i> )	Grauortolan ( <i>Emberiza caesia</i> )
Eismöwe ( <i>Larus hyperboreus</i> )	Bergkalanderlerche ( <i>Melanocorypha bimaculata</i> )	Zwergammer ( <i>Emberiza pusilla</i> )
Polarmöwe ( <i>Larus glaucooides</i> )	Kalanderlerche ( <i>Melanocorypha calandra</i> )	Waldammer ( <i>Emberiza rustica</i> )
Heringsmöwe ( <i>Larus fuscus</i> ; nur Unterarten <i>graellsii</i> <sup>8</sup> und <i>heuglini</i> <sup>8</sup> )	Schwarzsteppenlerche ( <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> )	Kappenammer ( <i>Emberiza melanocephala</i> )
Dreizehenmöwe ( <i>Rissa tridactyla</i> )	Turkestanlerche ( <i>Alaudala heinei</i> )	
	Rötelschwalbe ( <i>Cecropis daurica</i> )	

## Änderungen in dieser Liste (chronologisch)

### Ab 1.1.2023:

Schwarzstirnwürger sind nur noch abseits etablierter Brutgebiete (Seewinkel, Parndorfer Platte) zu melden.

### Ab 1.1.2022:

Kuhreiher und Kormorane der ssp. *carbo* werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Parallel zur neuen „Artenliste der Vögel Österreichs“ (Dez. 2021) wurde auch die Taxonomie dieser Liste angepasst und folgt nun der „World Bird List“ in der Fassung 11.2 des IOC (Gill et al. 2021). Nachweise des Kaiseradlers sind nur noch aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg zu melden.

**Ab 1.1.2021:** Nachweise der Unterart *graellsii* der Heringsmöwe sind künftig zu melden. Adlerbussard, Steppenweihe und Brandseeschwalbe werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Für Zitronenstelze und Rosenstar sind nur Meldungen in der zweiten Jahreshälfte ab 1.7. dokumentationspflichtig. Die Waldsaatgans wird neu in die Liste der dokumentationspflichtigen Arten aufgenommen.

**Ab 1.1.2020:** Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt. Nachweise der Großstrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

**Ab 1.1.2019:** Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

**Ab 19.11.2017:** Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreiher (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

**Ab 1.7.2016:** Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südstyrienmark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

**Ab 8.12.2012:** Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

**Ab 1.1.2010:** Für die folgenden Arten ist keine Dokumentation an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via [www.omitho.at](http://www.omitho.at) an BirdLife Österreich zu melden. Rostgans: Wildvögel können nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt. Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern auf [www.omitho.at](http://www.omitho.at) zu melden. Zwergohreule. Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten. Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). Zwergseeschwalbe. Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen: Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden. Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist. Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos). Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

**Ab 29.11.2009:** Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

